

FORPUS FAMILIEN OMFATTER 7 ARTER MED I ALT 19 UNDERARTER

DE 7 ARTER:

Lessons spurvepapegøje

(Spurvepapegøje) (*Forpus coelestis*); En af de største arter med en klar grøn maske. Det er langt den mest almindelige spurvepapegøjeart i fugleholdet i hele Europa. Arten har et roligt temperament, er let at holde og er meget ynglevillig. Deres popularitet skyldes ikke mindst den voksende mængde mutationer. **Udbredelse:** Sydvestlige Ecuador og nordvestlige Peru. **Underarter:** Ingen.



Grønrygget spurvepapegøje

(*Forpus passerinus*); En af de mindre arter, med vekslende lysegrønne farver. Arten er relativt almindelig i Danmark. Er let at holde og yngler villigt under de rette forhold. En enkelt mutation er etableret i fugleholdet. **Udbredelse:** Forekommer i Guyana, Surinam og Fransk Guyana, de øvrige underarter desuden i landene Brasilien, Venezuela og Colombia. **Underarter:** Spengels spurvepapegøje (*F. p. spengeli*), var tidligere almindelig i Danmark. Er desværre blevet krydset med grønrygget spurvepapegøje, og der er nu meget få renavlede fugle i fugleholdet. Venezuela grønrygget spurvepapegøje (*F. p. viridissimus*), er desværre formodentlig uddød som renavlet underart i fugleholdet. Øvrige underarter, der ikke findes i fugleholdet: *F. p. cyanophanes*, *F. p. cyanochlorus* og *F. p. deliciosus*.




Brille spurvepapegøje

(*Forpus conspicillatus*); En af de mindre arter af spurvepapegøje hvor hannen har blå tegninger omkring øjet. Det er en af de almindeligst opdrættede spurvepapegøjer i Europa herunder i Danmark hvor den er relativt almindelig i fugleholdet. Den er ynglevillig og har et roligt temperament. Enkelte mutationer er etableret i fugleholdet. **Udbredelse:** Colombia og det sydlige Panama og østligste Venezuela. **Underarter:** *F. c. metae* og *F. c. caucae*.



Blårygget spurvepapegøje

(*Forpus xanthopterygius*); En af de mindre arter af spurvepapegøjer med afdæmpede grønne og blå farver. Var tidligere mere udbredt i fugleholdet men har været næsten forsvundet fra det europæiske fuglehold, men blev opretholdt i Tyskland. I 2012 kom der enkelte par af arten til Danmark fra den tyske bestand. Arten kan ansføres til at yngle under de rette forhold, men er mere frygtsomt anlagt end flere af de andre arter. **Udbredelse:** Argentina, Paraguay og Brasilien, de øvrige underarter desuden i Ecuador og Bolivia. **Underarter:** Ceara blårygget spurvepapegøje (*F. x. flavissimus*), var tidligere mere udbredt i det europæiske fuglehold men er nu meget sjælden og tæt på at uddø i fugleholdet. Øvrige underarter, der ikke findes i fugleholdet: *F. x. crassirostris* og *F. c. flavescens*.



Mexicansk spurvepapegøje

(*Forpus cyanopygius*); En af de største arter og den eneste spurvepapegøje hvor hannen kun har lyseblå, og ingen mørkeblå, farver. Arten er sjælden i hele Europa, men der er en lille bestand der opretholdes løbende af få opdrættere. En enkelt dansk opdrætter har, gennem en længere årrække, stået for en stor andel af det samlede europæiske opdræt. Arten er svær at få til at yngle, og mange opgiver inden de opnår opdræt. Ofte yngler fuglene først når de er flere år gamle. Fuglene forholder og bevæger sig ofte roligt, men det kan dække over et nervøst gemyt. **Udbredelse:** Mexico. **Underarter:** *F. c. insularis*, der ikke findes i fugleholdet.



Gulmasket spurvepapegøje

(*Forpus xanthops*); Den største af spurvepapegøjearterne med en klar gul maske. Arten har en sund bestand i fugleholdet og er blevet ret almindelig i Danmark. Arten har et roligt temperament og er blevet mindre vanskelig og kan ofte ansføres til at yngle under de rette forhold, dog oftest først fra de er ca. 2 år. **Udbredelse:** Marañón-floddalen i det nordvestlige Peru. **Underarter:** Ingen.



(*Forpus melanotos*), findes kun under beskyttede forhold, og det er usandsynligt, at den kommer i hænderne på fugleholdere. **Udbredelse:** Forekommer i Peru, Brasilien, Ecuador og Colombia. **Underarter:** *F. m. sclateri*.